

# ANAFLEX

## Diclofenaco Sódico

### Diclofenaco Sódico 25 miligramos Cápsulas Blandas

Industria Argentina  
VL Venta Libre

#### ACCIÓN TERAPÉUTICA Antiinflamatorio. Analgésico.

#### FÓRMULA

Cada Cápsula Blanda contiene: Diclofenaco Sódico (equivalente a 23,27 mg de Diclofenaco) 25 miligramos. Excipientes: Polietilenglicol; Agua Purificada; Povidona; Propilenglicol; Sorbitol / Glicerina; Amarillo de Quinolina W.S.; Gelatina.

**No utilice este medicamento si el envase de las cápsulas (blister) está abierto o presenta marcas de adulteración. Como todo medicamento, ANAFLEX no debe consumirse después de la fecha de vencimiento que figura en el envase.**

#### USO ADECUADO DE ANAFLEX LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACIÓN.

**¿Qué es ANAFLEX? ANAFLEX** Cápsulas Blandas es un medicamento indicado para aliviar dolores de espalda, dolores musculares y de las articulaciones, dolores producidos por artritis. Dolores menstruales.

#### ¿Cómo se usa ANAFLEX?

Dosis habitual: adultos y niños mayores de 15 años:

**ANAFLEX** 1 cápsula blanda 3 veces por día (cada 8 horas).

Dolor menstrual: **ANAFLEX** 1 cápsula 1 ó 2 veces por día.

- Ingerir las cápsulas blandas preferentemente después de las comidas.
- **Dosis máxima:** 3 cápsulas blandas de 25 mg (75 mg de Diclofenaco Sódico 25 miligramos por día).
- **Mayores de 65 años:** consulte con su médico.
- **Niños menores de 15 años:** consulte con su médico.
- Utilizar la dosis mínima efectiva en personas de edad avanzada, debilitadas o de escaso peso corporal.
- Transcurridos 3 días de uso sin mejoría de los síntomas o con empeoramiento del padecimiento, se recomienda consultar con un médico.
- No se recomienda utilizar por más de 5 días sin control médico.
  - No superar las dosis máximas recomendadas ni acortar los intervalos entre las mismas (olvidos u omisiones), salvo por orden médico.

#### CONTRAINDICACIONES

No utilizar **ANAFLEX** en caso de:

- Alergia conocida a alguno de los componentes de la fórmula. Ante la duda, consulte con su médico.
- Personas a quienes la aspirina u otros analgésicos / antiinflamatorios les producen asma, rinitis, urticaria o reacciones alérgicas serias,

- Úlcera u otras enfermedades gastrointestinales serias,
- Enfermedades serias de la sangre, hígado o riñón,
- Hemorragias, alteraciones de la coagulación o tratamiento anticoagulante,
- Tratamiento intensivo con diuréticos,
- Insuficiencia hepática o renal,
- Embarazo o lactancia,
- Menores de 15 años.

#### ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Si se presentaran síntomas de hipersensibilidad o alergia sin antecedentes conocidos, suspender la ingestión de **ANAFLEX**.

Si consume otro medicamento por alguna enfermedad crónica, consulte a su médico.

Antes de utilizar **ANAFLEX** conjuntamente con otros medicamentos es conveniente consultar al médico.

Si usted consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

Si usted padece alguna enfermedad cardíaca o presenta factores de riesgo cardiovasculares como por ejemplo hipertensión arterial, diabetes, hiperlipidemia (colesterol y triglicéridos elevados), obesidad, tabaquismo, etc. deberá ingerir la dosis indicada por no más de 5 días para el dolor o 3 días para la fiebre.

**Ante la duda, consulte con su médico y/o farmacéutico.**

#### REACCIONES ADVERSAS

Este medicamento puede producir molestias gastrointestinales (por ej. náuseas, vómitos, diarrea / constipación, dolores cólicos), dolor de cabeza, mareos, erupción en la piel.

**Síntomas de hipersensibilidad:** picazón, urticaria o erupciones serias de la piel, hinchazón de piernas, párpados o manos, dificultad para respirar.

Todos estos síntomas, como así también otros no especificados, pueden ser atribuidos o no al uso del producto; por lo tanto, si usted presenta alguno de los mismos u otro tipo de sintomatología que le despierte sospecha, le sugerimos acudir inmediatamente al médico.

#### SOBREDOSIFICACIÓN

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con un Centro de Toxicología, por ejemplo:

- Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,
- Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115,
- Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777,
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata, Tel.: (0221) 451-5555.

#### PRESENTACIÓN

Envases conteniendo 10 y 20 Cápsulas Blandas ovaladas, color amarillo.

**Conservar el producto a una temperatura no mayor de 25 °C. Mantener en su envase original. No conservar en heladera.**

#### ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO

AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, **ANAFLEX** DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 50.778.

Prospecto autorizado por la A.N.M.A.T. Disp. Nro. 3308/07.

Encapsulado en Av. Márquez Nro. 691. Pdo. de 3 de Febrero. Pcia. de Bs. As.

#### Laboratorios Bagó S.A.

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (011) 4344-2000/19.

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.

Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA). La Plata. Pcia. de Buenos Aires.

Tel.: (0221) 425-9550/54.

50999374

ANTIINFLAMATORIO  
ANALGÉSICO

Cápsulas Blandas de **rápida acción**

[www.anaflex.com.ar](http://www.anaflex.com.ar)  
[www.bago.com.ar](http://www.bago.com.ar)  
[www.bagoconsumomasivo.com.ar](http://www.bagoconsumomasivo.com.ar)

VL VENTA LIBRE

**Bagó**