

ANAFLEX

Diclofenaco Sódico

Diclofenaco Sódico 25 miligramos Cápsulas Blandas

Industria Argentina
VL Venta Libre

ACCIÓN TERAPÉUTICA Antiinflamatorio. Analgésico.

FÓRMULA

Cada Cápsula Blanda contiene: Diclofenaco Sódico (equivalente a 23,27 mg de Diclofenaco) 25 miligramos. Excipientes: Polietilenglicol; Agua Purificada; Povidona; Propilenglicol; Sorbitol / Glicerina; Amarillo de Quinolina W.S.; Gelatina.

No utilice este medicamento si el envase de las cápsulas (blister) está abierto o presenta marcas de adulteración. Como todo medicamento, ANAFLEX no debe consumirse después de la fecha de vencimiento que figura en el envase.

USO ADECUADO DE ANAFLEX LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACIÓN.

¿Qué es ANAFLEX? ANAFLEX Cápsulas Blandas es un medicamento indicado para aliviar dolores de espalda, dolores musculares y de las articulaciones, dolores producidos por artritis. Dolores menstruales.

¿Cómo se usa ANAFLEX?

Dosis habitual: adultos y niños mayores de 15 años:

ANAFLEX 1 cápsula blanda 3 veces por día (cada 8 horas).
Dolor menstrual: **ANAFLEX** 1 cápsula 1 ó 2 veces por día.

- Ingerir las cápsulas blandas preferentemente después de las comidas.
- **Dosis máxima:** 3 cápsulas blandas de 25 mg (75 mg de Diclofenaco Sódico 25 miligramos por día).
- **Mayores de 65 años:** consulte con su médico.
- **Niños menores de 15 años:** consulte con su médico.
- Utilizar la dosis mínima efectiva en personas de edad avanzada, debilitadas o de escaso peso corporal.
- Transcurridos 3 días de uso sin mejoría de los síntomas o con empeoramiento del padecimiento, se recomienda consultar con un médico.
- No se recomienda utilizar por más de 5 días sin control médico.
 - No superar las dosis máximas recomendadas ni acortar los intervalos entre las mismas (olvidos u omisiones), salvo por orden médica.

CONTRAINDICACIONES

No utilizar **ANAFLEX** en caso de:

- Alergia conocida a alguno de los componentes de la fórmula. Ante la duda, consulte con su médico.
- Personas a quienes la aspirina u otros analgésicos / antiinflamatorios les producen asma, rinitis, urticaria o reacciones alérgicas serias,

- Úlcera u otras enfermedades gastrointestinales serias,
- Enfermedades serias de la sangre, hígado o riñón,
- Hemorragias, alteraciones de la coagulación o tratamiento anticoagulante,
- Tratamiento intensivo con diuréticos,
- Insuficiencia hepática o renal,
- Embarazo o lactancia,
- Menores de 15 años.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Si se presentaran síntomas de hipersensibilidad o alergia sin antecedentes conocidos, suspender la ingestión de **ANAFLEX**.

Si consume otro medicamento por alguna enfermedad crónica, consulte a su médico.

Antes de utilizar **ANAFLEX** conjuntamente con otros medicamentos es conveniente consultar al médico.

Si usted consume 3 (tres) o más vasos diarios de bebida alcohólica consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Si usted está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando de mamar consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

Si usted padece alguna enfermedad cardíaca o presenta factores de riesgo cardiovasculares como por ejemplo hipertensión arterial, diabetes, hiperlipidemia (colesterol y triglicéridos elevados), obesidad, tabaquismo, etc. deberá ingerir la dosis indicada por no más de 5 días para el dolor o 3 días para la fiebre.

Ante la duda, consulte con su médico y/o farmacéutico.

REACCIONES ADVERSAS

Este medicamento puede producir molestias gastrointestinales (por ej. náuseas, vómitos, diarrea / constipación, dolores cólicos), dolor de cabeza, mareos, erupción en la piel.

Síntomas de hipersensibilidad: picazón, urticaria o erupciones serias de la piel, hinchazón de piernas, párpados o manos, dificultad para respirar.

Todos estos síntomas, como así también otros no especificados, pueden ser atribuidos o no al uso del producto; por lo tanto, si usted presenta alguno de los mismos u otro tipo de sintomatología que le despierte sospecha, le sugerimos acudir inmediatamente al médico.

SOBREDOSIFICACIÓN

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con un Centro de Toxicología, por ejemplo:

- Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,
- Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115,
- Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648 / 4658-7777,
- Centro de Asistencia Toxicológica La Plata, Tel.: (0221) 451-5555.

PRESENTACIÓN

Envases conteniendo 10 y 20 Cápsulas Blandas ovaladas, color amarillo.

Conservar el producto a una temperatura no mayor de 25 °C. Mantener en su envase original. No conservar en heladera.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO

AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, **ANAFLEX** DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 50.778.

Prospecto autorizado por la A.N.M.A.T. Disp. Nro. 3308/07.

Encapsulado en Av. Márquez Nro. 691. Pdo. de 3 de Febrero. Pcia. de Bs. As.

Laboratorios Bagó S.A.

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (011) 4344-2000/19.

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.

Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA). La Plata. Pcia. de Buenos Aires.

Tel.: (0221) 425-9550/54.

50999374

ANTIINFLAMATORIO
ANALGÉSICO

Cápsulas Blandas de **rápida acción**

www.anaflex.com.ar
www.bago.com.ar
www.bagoconsumomasivo.com.ar

VL VENTA LIBRE

Bagó