

Analgésico. Antifebril

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

Comprimidos
Vía de administración oral

¿QUÉ CONTIENE ANAFLEX FORTE?

Cada Comprimido contiene: Paracetamol 650 miligramos. Excipientes: Almidón Pregelatinizado; Povidona; Almidón Glicolato de Sodio; Ácido Estearico.

Este Medicamento es Libre de Gluten

ACCIONES

Analgésico. Antifebril.

¿PARA QUÉ SE USA ANAFLEX FORTE?

Anaflex Forte es un medicamento que se utiliza para el alivio sintomático de dolores de cabeza, menstruales, musculares articulares, dentales leves a moderados, alivio de estados gripales y/o resfríos y para reducir la fiebre.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR ANAFLEX FORTE?

Alergia conocida al Paracetamol. No debe iniciarse el tratamiento en pacientes a quienes la aspirina u otros analgésicos antiinflamatorios les producen asma, rinitis, urticaria, o reacciones alérgicas severas. Úlcera péptica activa. Antecedentes de úlcera recurrente. **Anaflex Forte** Comprimidos no puede ser administrado en caso de enfermedad hepática, hepatitis virales, trastornos renales o alcoholismo. Enfermedad del riñón, corazón o pulmones. Anemia (disminución de los glóbulos rojos o de la hemoglobina). Menores de 12 años.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

El Paracetamol puede causar daño hepático cuando se ingiere en altas dosis.

No tomar más cantidad de medicamento que la recomendada en el apartado “¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?”. Si tiene antecedentes de enfermedad del tracto digestivo superior (boca, faringe, esófago y estómago), por la posibilidad de sangrado, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

No ingiera otro medicamento que contenga Paracetamol u otro analgésico.

Se ha notificado una enfermedad grave denominada acidosis metabólica (una anomalía en la sangre y los líquidos) en pacientes que padecen enfermedades graves, como insuficiencia renal severa o sepsis (cuando las bacterias y sus toxinas circulan en la sangre, lo que provoca daños en los órganos), o que padecen malnutrición, alcoholismo crónico, cuando se utiliza paracetamol a dosis regulares durante un periodo prolongado o cuando se toma paracetamol junto con un antibiótico llamado flucloxacilina. Los síntomas de acidosis metabólica pueden incluir: dificultad respiratoria grave con respiración profunda y rápida, somnolencia, sensación de malestar (náuseas) y vómitos, si presenta alguno de estos síntomas consulte a su médico.

Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

Si usted consume 3 o más vasos diarios de bebida alcohólica consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

El Paracetamol puede tener interacciones con algunos de los siguientes medicamentos: anticoagulantes orales (utilizados para evitar la coagulación de la sangre); antiepilépticos (utilizados para el tratamiento de crisis epilépticas); diuréticos (utilizados para aumentar la eliminación de orina); isoniazida y rifampicina (utilizados para el tratamiento de la tuberculosis); medicamentos antifébriles; no utilizar con otros analgésicos (medicamentos que disminuyen el dolor).

Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Si usted tiene dudas con respecto a estas instrucciones consulte con su médico.

No utilice este medicamento si el envase está abierto o presenta marcas de adulteración. Anaflex Forte no debe consumirse después de la fecha de vencimiento que aparece al dorso del envase.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Pueden aparecer efectos no deseados causados por este medicamento como: erupciones cutáneas (hinchazón y enrojecimiento de la piel), alteraciones en la sangre (disminución de plaquetas), náuseas, vómitos y malestar gástrico. Si algo de esto sucede suspenda la medicación y consulte a su médico.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido cada 6 u 8 horas. Dosis máxima: 4 gramos por día (6 comprimidos de 650 mg).

Pacientes mayores a 65 años y niños menores de 12 años: consulte a su médico.

No utilizar por más de 5 días para el dolor y 3 días para la fiebre, o bien si el dolor o la fiebre empeoran o aparecen otros síntomas.

síntomas, en estos casos suspenda la medicación y consulte a su médico.
Ingerir los comprimidos de **Anaflex Forte** con suficiente líquido. La presencia de alimentos en el estómago en el momento de la ingestión suele mejorar la tolerabilidad, sin afectar su efecto terapéutico en forma significativa.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Ante la eventualidad de una sobredosis, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con un Centro de Toxicología, en especial:

- Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,
- Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115,
- Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.

PRESENTACIONES

Envases con 10 y 20 Comprimidos.

FORMA DE CONSERVACIÓN

Conservar el producto a temperatura ambiente no mayor a 30 °C. Mantener en su envase original.

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Para información adicional del producto comunicarse con el Servicio de Orientación Integral Bagó al 0800-666-2454 / soibago@bago.com.ar o con A.N.M.A.T. Responde: 0800-333-1234.

www.bago.com.ar
www.bagoconsumomasivo.com.ar

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO**

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 11.599.
Prospecto autorizado por A.N.M.A.T. Disp. Nro. XXXXX/202X

Elaborado en calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA). La Plata. Buenos Aires. Argentina.



Ética al servicio de la salud

LABORATORIOS BAGÓ S.A.
Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina. Tel.: (011) 4344-2000/19.
Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.

51005556

		Laboratorios Bagó S.A. Departamento de Ingeniería de Productos		
CÓDIGO	51005556	MATERIAL DE ACONDICIONAMIENTO		
PROGRAMA	InDesign		FECHA	FIRMA
ESCALA	1:1			
PIEZA GRÁFICA	Prospecto	CONFECCIÓN	30/09/25	Giomi
TINTAS: Frente Dorso				
432 C 432 C				
OBSERVACIONES				
Control dimensional, remitirse a plano correspondiente.				