

PROYECTO DE PROSPECTO

Anaflex

Paracetamol 500 miligramos

Comprimidos

Vía de administración oral

Industria Argentina

VL Venta Libre



Analgésico. Antifebril

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR EL MEDICAMENTO

¿QUÉ CONTIENE ANAFLEX?

Cada Comprimido contiene: Paracetamol 500 miligramos. Excipientes: Almidón Pregelatinizado; Povidona; Almidón Glicolato de Sodio; Ácido Esteárico.

Este Medicamento es Libre de Gluten

ACCIONES

Analgésico. Antifebril.

¿PARA QUÉ SE USA ANAFLEX?

Anaflex es un medicamento que se utiliza para el alivio sintomático de dolores (de cabeza, menstruales, musculares) leves a moderados, alivio de estados gripales y/o resfriados y reducir la fiebre.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR ANAFLEX?

Alergia conocida al Paracetamol. No debe iniciarse el tratamiento en pacientes a quienes la aspirina u otros analgésicos, antinflamatorios les producen asma, rinitis, urticaria, o reacciones alérgicas severas. Ulcera péptica activa. Antecedentes de úlcera recurrente.

Anaflex Comprimidos no puede ser administrado en caso de enfermedad hepática, hepatitis virales, trastornos renales o alcoholismo. Enfermedad del riñón, corazón o pulmones. Anemia (disminución de los glóbulos rojos o de la hemoglobina). Menores de 12 años.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

El Paracetamol puede causar daño hepático cuando se ingiere en altas dosis.

No tomar más cantidad de medicamento que la recomendada en el apartado "¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?".

IF-2025-33210808-APN-DGA#ANMAT

Bagó

PP ANA 500 Com V01

1

Página 1 de 3

Página 2 de 36

Ética al servicio de la salud

Si tiene antecedentes de enfermedad del tracto digestivo superior (boca, faringe, esófago y estómago), por la posibilidad de sangrado consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

No ingiera otro medicamento que contenga Paracetamol u otro analgésico.

Se ha notificado una enfermedad grave denominada acidosis metabólica (una anomalía en la sangre y los líquidos) en pacientes que padecen enfermedades graves, como insuficiencia renal severa o sepsis (cuando las bacterias y sus toxinas circulan en la sangre, lo que provoca daños en los órganos), o que padecen malnutrición, alcoholismo crónico, cuando se utiliza paracetamol a dosis regulares durante un período prolongado o cuando se toma paracetamol junto con un antibiótico llamado flucloxacilina. Los síntomas de acidosis metabólica pueden incluir: dificultad respiratoria grave con respiración profunda y rápida, somnolencia, sensación de malestar (náuseas) y vómitos, si presenta alguno de estos síntomas consulte a su médico.

El Paracetamol puede tener interacciones con algunos de los siguientes medicamentos: anticoagulantes orales (utilizados para evitar la coagulación de la sangre); antiepilepticos (utilizados para el tratamiento de crisis epilépticas); diuréticos (utilizados para aumentar la eliminación de orina); isoniazida y rifampicina (utilizados para el tratamiento de la tuberculosis); medicamentos antiinfecciosos; no utilizar con otros analgésicos (medicamentos que disminuyen el dolor). Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando o ha utilizado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta los derivados de hierbas.

Si usted consume 3 o más vasos diarios de bebida alcohólica consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Si usted tiene dudas con respecto a estas instrucciones consulte con su médico.

No utilice este medicamento si el envase está abierto o presenta marcas de adulteración. Anaflex no debe consumirse después de la fecha de vencimiento que aparece en el dorso del envase.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Pueden aparecer efectos no deseados causados por este medicamento como: erupciones cutáneas (hinchazón y enrojecimiento de la piel), alteraciones en la sangre (disminución de plaquetas), náuseas, vómitos y malestar gástrico. Si algo de esto sucede suspenda la medicación y consulte a su médico.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Adultos y niños mayores de 12 años: 1 comprimido cada 6 u 8 horas. Dosis máxima: 4 gramos por día (8 comprimidos de 500 mg). Pacientes mayores a 65 años y niños menores: consulte a su médico.

No utilizar por más de 5 días para el dolor y 3 días para la fiebre, o bien si el dolor o la fiebre empeoran o aparecen otros síntomas, en estos casos suspenda la medicación y consulte a su médico.

Ingerir los Comprimidos de **Anaflex** con suficiente líquido. La presencia de alimentos en el estómago en el momento de la ingestión suele mejorar la tolerabilidad, sin afectar su efecto terapéutico en forma significativa.

IF-2025-33210808-APN-DGA#ANMAT



¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Ante la eventualidad de una sobredosificación, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con un Centro de Toxicología, en especial:

- *Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,*
- *Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115,*
- *Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.*

PRESENTACIONES

Envases conteniendo 10, 20, 30 Comprimidos color blanco. Envases expendedores para fraccionar en Farmacias conteniendo 100, 200, 300 y 400 Comprimidos color blanco en blisters con su prospecto

FORMA DE CONSERVACIÓN

Conservar el producto a temperatura ambiente no mayor a 30 °C. Mantener en su envase original.

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Para información adicional del producto comunicarse con el Servicio de Orientación Integral Bagó al **0800-666-2454 / soibago@bago.com.ar** o con A.N.M.A.T. Responde: **0800-333-1234.**

www.bago.com.ar

www.bagoconsumomasivo.com.ar

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 11.599.
Prospecto autorizado por A.N.M.A.T. Disp. Nro.

Elaborado en: calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA) La Plata. Pcia. de Buenos Aires. Argentina.



Ética al servicio de la salud

LABORATORIOS BAGÓ S.A.

Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF). Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina.
Tel.: (011) 4344-2000/19.

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.



HRYCIUK Nadina Mariana
CUIL 27205366208

PP ANA 500 Com V01

3

Página 3 de 3

IF-2025-33210808-APN-DGA#ANMAT



Ética al servicio de la salud

Página 4 de 36



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2025-30707086- -APN-DGA#ANMAT

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.