

ANAFLEX PLUS

RÁPIDA ACCIÓN

Diclofenaco Sódico
Paracetamol

Diclofenaco Sódico 25 miligramos
Paracetamol 300 miligramos
Cápsulas Blandas

Industria Argentina
VL Venta Libre

Antiinflamatorio. Analgésico.

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR ANAFLEX PLUS RÁPIDA ACCIÓN

¿QUÉ CONTIENE ANAFLEX PLUS RÁPIDA ACCIÓN?

Cada Cápsula Blanda contiene: Diclofenaco Sódico (equivalente a 23,27 miligramos de Diclofenaco) 25 miligramos; Paracetamol 300 miligramos. Excipientes: Gelatina, Povidona, Propilenglicol, Polietilenglicol, Agua Purificada, Rojo Allura, Sorbitol / Glicerina.

ACCIONES

Alivia el dolor, desinflama.

ANAFLEX PLUS RÁPIDA ACCIÓN combina dos sustancias activas que se complementan: Diclofenaco, antiinflamatorio y Paracetamol, analgésico.

¿PARA QUÉ SE USA ANAFLEX PLUS RÁPIDA ACCIÓN?

ANAFLEX PLUS RÁPIDA ACCIÓN es un medicamento indicado para aliviar dolores de espalda, dolores musculares y de las articulaciones, dolores producidos por artritis. Dolores menstruales.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR ANAFLEX PLUS RÁPIDA ACCIÓN?

No use este medicamento en caso de: alergia a Diclofenaco, Paracetamol, aspirina u otros analgésicos / antiinflamatorios; úlcera u otras enfermedades gastrointestinales; enfermedades serias del corazón, hígado o riñón; alcoholismo; hemorragias, alteraciones de la coagulación, tratamiento anticoagulante o diurético intensivo.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR ANAFLEX PLUS RÁPIDA ACCIÓN?

Si Ud. consume algún medicamento por alguna enfermedad crónica, consulte a su médico antes de utilizar **ANAFLEX PLUS RÁPIDA ACCIÓN**.

Si Ud. consume 3 (tres) o más vasos de bebida alcohólica por día, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

Si Ud. está tomando algún otro medicamento, o está embarazada o dando de mamar, consulte a su médico antes de ingerir este medicamento.

No utilice este medicamento si el envase de las cápsulas (blister) está abierto o presenta marcas de adulteración. ANAFLEX PLUS RÁPIDA ACCIÓN no debe

consumirse después de la fecha de vencimiento que figura en el envase.

¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento, como por ejemplo náuseas, vómitos, diarrea o constipación, dolor abdominal, mareos, erupción en la piel, disminución en el recuento de plaquetas en el análisis de sangre.

¿CÓMO SE USA ANAFLEX PLUS RÁPIDA ACCIÓN?

Adultos y adolescentes a partir de los 15 años de edad: 1 cápsula blanda cada 8 horas.

Dosis máxima: 3 cápsulas blandas por día, repartidas cada 8 horas.

Niños menores de 15 años o adultos mayores de 65 años, consulte a su médico.

No utilizar por más de 5 días sin consulta médica.

Si los síntomas no mejoran o empeoran en 3 días, consulte a su médico.

Modo de administración: ingerir las cápsulas blandas indistintamente antes, durante o después de una comida ligera, preferentemente con un vaso completo de agua.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Ante la eventualidad de una sobredosis, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con un Centro de Toxicología, por ejemplo:

- Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Tel.: (011) 4962-6666/2247,
- Hospital Pedro de Elizalde (ex Casa Cuna), Tel.: (011) 4300-2115,
- Hospital Nacional Prof. Dr. Alejandro Posadas, Tel.: (011) 4654-6648/4658-7777.

PRESENTACIONES

Envases conteniendo 10 y 20 Cápsulas Blandas ovaladas, color rosa.

Conservar el producto a una temperatura no mayor de 30 °C. Mantener en su envase original. No conservar en heladera.

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

De ser necesaria información adicional sobre el producto comuníquese con Laboratorios Bagó: 0810-666-7766 o con A.N.M.A.T. Responde: 0800-333-1234.

www.bago.com.ar

www.anaflex.com.ar

www.bagoconsumomasivo.com.ar

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO.

AL IGUAL QUE TODO MEDICAMENTO, ANAFLEX PLUS RÁPIDA ACCIÓN DEBE SER MANTENIDO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado Nro. 56.765.

Fecha de última revisión: Abril/2013.

Encapsulado en Av. Márquez Nro. 691. Pdo. de 3 de Febrero. Pcia. de Bs. As.

LABORATORIOS BAGÓ S.A.

Administración: Bernardo de Irigoyen Nro. 248 (C1072AAF).

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tel.: (011) 4344-2000/19.

Director Técnico: Juan Manuel Apella. Farmacéutico.

Calle 4 Nro. 1429 (B1904CIA). La Plata. Provincia de Buenos Aires.

Tel.: (0221) 425-9550/54.



www.anaflex.com.ar
www.bago.com.ar
www.bagoconsumomasivo.com

Bagó